

7 FOUR 7



Tafelaardappel

- ✓ Middenvroeg witvlezig ras
- ✓ Uniforme langovale knollen
- ✓ Bijzonder hoge opbrengst
- ✓ Goede schilkwaliteit
- ✓ Geschikt voor wassen
- ✓ AM-resistentie (Ro1)



Eigenschappen

Fysiologie

Schilkleur	Lichtgeel
Vleeskleur	Wit
Vorm	Ovaal tot langovaal
Regelmaat vorm	6
% 35/65	67%
Aantal knollen per plant	13
Oogdiepte	8
Rijptijd	6,8
Kiemrust	6
Bewaarbaarheid	6
Stootblauw (0-50)	2
Rooibeschatiging	7
Holle harten	9

Opbrengst - kwaliteit

Relatieve opbrengst	113
Drogestofgehalte (OWG)	17,1% (307)
Kooktype	AB
Verkleuring na koken	7
Bakkleur na het oogsten	4
Bakkleur na bewaring	3

Resistentie

Phytophthora in het loof	3,7
Phytophthora in de knol	7,7
Schurft	6,7
Poederschurft	7
Globodera Ro 1 (A)	9
Wratziekte f1 (D1)	10
Kringerigheid (TRV)	6,1
Aardappel Y-virus	4

Teeltadvies (consumptie)

Hoeveelheid en plantafstand - Bemesting

Maat	kg/ha	75 cm rug
28/35 mm	1.300	24-26
35/45 mm	2.300	28-30
45/50 mm	3.400	31-33
35/50 mm	2.700	29-31
50/60 mm gesneden	2.800	29-31

Tel altijd het aantal knollen! Zwaardere gronden vereisen een nauwere plantafstand.

Meststof	% t.o.v. standaard	Toepassen		
		1 ^{ste}	2 ^{de}	3 ^{de}
N	100	2/4	1/4	1/4
P ₂ O ₅	100	4/4		
K ₂ O	100	4/4		



- Geschikt voor elke grondsoort.
- Knolbehandeling tegen zilverscurft is gewenst.
- Planten in het witte puntjes stadium geeft het beste resultaat.
- Op normale rugdiepte planten.
- Gebruik geen K-chloride als kaliumbron in het voorjaar.
- Lijkt niet vatbaar voor Metribuzin.

- Start met spuiten tegen Phytophthora bij 80% opkomst.

- Tweede stikstofgift als de plant begint met knolzetting.
- Start tijdig met spuiten tegen Alternaria.

- Derde stikstofgift rond de bloei.
- Start tijdig met spuiten tegen knolphytophthora.

- Geef na loofdoding knollen de kans af te rijpen voor het oogsten.
- Zorg na het oogsten voor goede ventilatie tijdens opslag tot de aardappels droog zijn.

