


AMANDA



Frites- en chipsaardappel

- ✓ Middenvroeg ras
- ✓ Geschikt voor frites, chips en vlokken
- ✓ Kooktype C
- ✓ AM-resistentie (Ro1,4 en Pa2,3)
- ✓ Wrastziekte resistentie (f1 en f6)



Eigenschappen

Fysiologie

Schilkleur	Geel
Vleeskleur	Lichtgeel
Vorm	Rondovaal tot ovaal
Regelmaat vorm	7
% 50+	69%
Aantal knollen per plant	16
Oogdiepte	7
Rijptijd	6,2
Kiemrust	7
Bewaarbaarheid	5
Stootblauw (0-50)	20
Rooibeschatiging	8
Holle harten	7

Opbrengst - kwaliteit

Relatieve opbrengst	101
Drogestofgehalte (OWG)	23,5% (436)
Kooktype	C
Verkleuring na koken	7
Bakkleur na het oogsten	8
Bakkleur na bewaring	7

Resistentie

Phytophthora in het loof	3,3
Phytophthora in de knol	8
Schurft	6,3
Poederschurft	4
Globodera Ro 1 (A)	9
Globodera Pa 2 (D)	8
Globodera Pa 3 (E)	9
Wrastziekte f1 (D1)	10
Wrastziekte f6 (O1)	10
Kringerigheid (TRV)	3,3
Aardappel Y virus	4

Teeltadvies (consumptie)

Hoeveelheid en plantafstand - Bemesting

Maat	kg/ha	75 cm rug
28/35 mm	1.100	26-28
35/45 mm	1.900	32-34
45/50 mm	2.700	36-38
35/50 mm	2.200	33-35
50/60 mm gesneden	2.200	33-35

Tel altijd het aantal knollen! Zwaardere gronden vereisen een nauwere plantafstand.

Meststof

	% t.o.v. standaard	Toepassen		
		1 ^{ste}	2 ^{de}	3 ^{de}
N	110	2/4	1/4	1/4
P ₂ O ₅	100	4/4		
K ₂ O	110	4/4		



- Planten in het witte puntjes stadium geeft het beste resultaat.
- Vatbaar voor kringerigheid (Tabaks Ratel Virus).
- Gebruik geen K-chloride als kaliumbron in het voorjaar.
- Lichtgevoelig voor Metribuzin. Gebruik maximaal 250 gram voor opkomst.
- Plant op gebruikelijke diepte in de rug.

- Start met spuiten tegen Phytophthora bij 80% opkomst.

- Tweede stikstofgift als de plant begint met knolzetting.
- Start tijdig met behandeling tegen Alternaria.

- Derde stikstofgift rond de bloei.
- Start tijdig met behandeling tegen knolphytophthora.

- Geef na loofdoding knollen de kans af te rijpen voor het oogsten.
- Licht gevoelig voor stootblauw.
- Zorg na het oogsten voor goede ventilatie tijdens opslag tot de aardappels droog zijn. Tijdens langdurige bewaring regelmatig ventileren en geleidelijk afkoelen naar 6-7°C. Voor transport langzaam opwarmen tot 15°C.



Deze informatie is naar beste weten en overtuiging opgesteld en dient ter oriëntatie en besluitvorming. Rangetzien de aardappel een natuurlijk product is, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen. Neem voor vragen of advies contact op met je teeltbegeleider of mail info@denhartigh-potato.nl.

VERSIE OKTOBER 2022