



## Biologische tafelaardappel

- ✓ Middenlaat geelvezig ras
- ✓ Hoge opbrengst
- ✓ Goede resistentie tegen Phytophthora
- ✓ Goede resistentie tegen Y-virus
- ✓ Low input
- ✓ Sterk tegen schurft



## Eigenschappen

### Fysiologie

Schilkleur	Geel
Vleeskleur	Geel
Vorm	Rondovaal
Regelmaat vorm	6
% 35/65	79%
Aantal knollen per plant	13
Oogdiepte	7
Rijptijd	5,5
Kiemrust	8
Bewaarbaarheid	7
Stootblauw (0-50)	6
Rooibeschatiging	7

### Opbrengst - kwaliteit

Relatieve opbrengst	115
Drogestofgehalte (OWG)	20,9% (385)
Kooktype	BC
Verkleuring na koken	5
Bakkleur na het oogsten	4
Bakkleur na bewaring	4

### Resistentie

Phytophthora in het loof	8,6
Phytophthora in de knol	9,1
Schurft	7
Poederschurft	7
Wratziekte f1 (D1)	10
Kringerigheid (TRV)	8,1
Aardappel Y virus	9

## Teeltadvies (consumptie)

### Hoeveelheid en plantafstand - Bemesting

Maat	kg/ha	75 cm rug
28/35 mm	1.000	26-28
35/45 mm	1.800	30-32
45/50 mm	2.800	33-35
35/50 mm	2.200	31-33
50/60 mm gesneden	2.300	31-33

Tel altijd het aantal knollen! Zwaardere gronden vereisen een nauwere plantafstand.

Meststof	% t.o.v. standaard	Toepassen		
		1 <sup>ste</sup>	2 <sup>de</sup>	3 <sup>de</sup>
N	80	4/4		
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	100	4/4		
K <sub>2</sub> O	100	4/4		



- Geschikt voor elke grondsoort.
- Planten in het witte puntjes stadium geeft het beste resultaat.
- Groeit vrij diep, daarom iets boven normale pootdiepte potten.
- Niet in koude grond planten.
- Heeft minder stikstof nodig dan andere rassen.
  
- Goede loofontwikkeling en vroege loofbedekking.
  
- Doe een proefrooiing voor de maat. Besteed voldoende aandacht aan loofdoding.
  
- Laat de knollen goed afharden voor het oogsten.
- Zorg na het oogsten voor goede ventilatie tijdens opslag tot de aardappels droog zijn. Ventileer regelmatig bij langdurige bewaring tot de aardappels droog zijn en koel ze langzaam af tot 4-5°C.