

# DIOR



## Tafelaardappel

- ✓ Vroeg ras
- ✓ Hoge opbrengst
- ✓ Goede tolerantie voor hitte en droogte
- ✓ AM-resistentie (Ro1)
- ✓ Wratziekte resistentie (f1)

## Eigenschappen

### Fysiologie

Schilkleur	Lichteel
Vleeskleur	Lichtgeel
Vorm	Rondovaal tot ovaal
Regelmaat vorm	7
Aantal knollen per plant	11
Oogdiepte	7
Rijptijd	7,6
Kiemrust	8
Bewaarbaarheid	8
Stootblauw (0-50)	1
Rooibeschatiging	5
Holle harten	9

### Opbrengst - kwaliteit

Relatieve opbrengst	107
Drogestofgehalte (OWG)	16,8% (300)
Kooktype	A
Verkleuring na koken	7
Bakkleur na het oogsten	3
Bakkleur na bewaring	3

### Resistentie

Phytophthora in het loof	5,2
Phytophthora in de knol	9
Schurft	6
Poederschurft	4
Globodera Ro 1 (A)	9
Wratziekte f1 (D1)	10
Kringerigheid (TRV)	8,3
Aardappel Y virus	6



Deze informatie is naar beste weten en overtuiging opgesteld en dient ter oriëntatie en besluitvorming. Rangetzien de aardappel een natuurlijk product is, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen. Neem voor vragen of advies contact op met je teelthegeleider of mail [info@denhartigh-potato.nl](mailto:info@denhartigh-potato.nl).

VERSIE OKTOBER 2022

## Teeltadvies (pootgoed)

### Hoeveelheid en plantafstand - Bemesting

Maat	kg/ha	75 cm rug
28/35 mm	2.100	11-13
35/55 mm	5.000	15-17
55/60 mm	7.100	19-21

Tel altijd het aantal knollen! Zwaardere gronden vereisen een nauwere plantafstand.

Meststof	% t.o.v. standaard	Toepassen		
		1 <sup>ste</sup>	2 <sup>de</sup>	3 <sup>de</sup>
N	110	4/4		
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	100	4/4		
K <sub>2</sub> O	100	4/4		



- Bewaring met Talent heeft positief effect op knolaantal.
- Knolbehandeling tegen zilverschurft is gewenst.
- Geschikt voor elke grondsoort.
- Planten in het witte puntjes stadium geeft het beste resultaat.
- Rhizoctonia behandeling bij planten is gewenst.
- Voorkom condensatie voor en tijdens het planten om besmetting te voorkomen.
- Plant 1 cm onder maaiveld
- Start bij 80% opkomst met spuiten tegen Phytophthora.
- Houd een strak spuitschema aan met luizenbestrijding.
- Start tijdig met selectie en keer frequent terug voor controle.
- Geeft geen problemen rond loofdoding.
- Wacht met rooien tot de schil is afgehard.
- Wees voorzichtig met moederknollen en voorkom rooibeschatiging.
- Zorg na het oogsten voor goede ventilatie tijdens de bewaring tot de aardappels droog zijn. Tijdens langdurige bewaring regelmatig ventileren en geleidelijk afkoelen. Voor transport langzaam opwarmen.