


# FORZA



## Frites- en tafelaardappel

- ✓ Vroeg geelvezig ras
- ✓ Zeer geschikt voor frites
- ✓ Goede consumptie kwaliteit
- ✓ AM-resistentie (Ro1, Pa2 en Pa3)
- ✓ Goed te bewaren



## Eigenschappen

### Fysiologie

Schilkleur	Geel
Vleeskleur	Geel
Vorm	Langovaal
Regelmaat vorm	7
% 50+	61%
Aantal knollen per plant	11
Oogdiepte	8
Rijptijd	8,1
Kiemrust	8
Bewaarbaarheid	7
Stootblauw (0-50)	4
Rooibeschatiging	7
Holle harten	9

### Opbrengst - kwaliteit

Relatieve opbrengst	100
Drogestofgehalte (OWG)	21,5% (396)
Kooktype	B
Verkleuring na koken	7
Bakkleur na het oogsten	8
Bakkleur na bewaring	7

### Resistentie

Phytophthora in het loof	3,1
Phytophthora in de knol	6,3
Schurft	4,7
Poederschurft	4
Globodera Ro 1 (A)	9
Globodera Pa 2 (D)	8
Globodera Pa 3 (E)	7
Kringerigheid (TRV)	6,3
Aardappel Y virus	6,8

## Teeltadvies (consumptie)

### Hoeveelheid en plantafstand - Bemesting

Maat	kg/ha	75 cm rug
28/35 mm	1.300	25-27
35/45 mm	2.300	31-33
45/50 mm	3.500	35-37
35/50 mm	2.800	32-34
50/60 mm gesneden	3.000	32-34

Tel altijd het aantal knollen! Zwaardere gronden vereisen een nauwere plantafstand.

Meststof	% t.o.v. standaard	Toepassen		
		1 <sup>ste</sup>	2 <sup>de</sup>	3 <sup>de</sup>
N	100	4/4		
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	110	4/4		
K <sub>2</sub> O	100	4/4		



- Niet planten op lichte gronden waar schurft en kringerigheid problemen kunnen veroorzaken.
- Gebruik geen K-chloride als kaliumbron in de lente.
- Genoeg fosfaten in de grond zorgen voor een goede beworteling.
- Planten in warme grond geeft het beste resultaat.
- Plant op normale diepte in de rug, 28/35 iets boven het maaiveld planten.
- Gebruik fysiologisch jong uitgangsmateriaal en plant in het witte puntjesstadium. Wij adviseren een nauwe pootafstand.

- Ruggen in twee stappen opbouwen. Frezen net voor opkomst.
- Gevoelig voor Metribuzin. Gebruik alleen lichte dosis en direct na het opbouwen van de ruggen.
- Geen chemische onkruidbestrijding na opkomst.
- Geeft voldoende loof. Tweede bemestingsgift is onder normale omstandigheden niet nodig.

- Start tijdig met beregenen.
- Start tijdig met preventieve behandeling tegen Alternaria.
- Start tijdig met behandeling tegen knolphytophthora.

- Verwijder moederknollen en voorkom schade tijdens bewaring.
- Zorg na het oogsten voor goede ventilatie tijdens de bewaring tot de aardappels droog zijn.
- Bij langdurige bewaring regelmatig ventileren en aardappels geleidelijk koelen tot 6-7°C. Voor transport langzaam opwarmen tot 15°C.

