

# GRANOLA



## Tafelaardappel

- ✓ Middenlaat ras
- ✓ Hoge opbrengst
- ✓ Geschikt voor teelt op hoogte
- ✓ Sterk tegen schurft
- ✓ AM-resistentie (Ro1)



## Eigenschappen

### Fysiologie

Schilkleur	Geel
Vleeskleur	Geel
Vorm	Rond tot rondovaal
Regelmaat vorm	7
Aantal knollen per plant	13
Oogdiepte	7
Rijptijd	6,1
Kiemrust	8
Bewaarbaarheid	8
Stootblauw (0-50)	11
Roibeschatiging	8

### Opbrengst - kwaliteit

Relatieve opbrengst	106
Drogestofgehalte (OWG)	20% (366)
Kooktype	B
Verkleuring na koken	6
Bakkleur na het oogsten	3
Bakkleur na bewaring	4

### Resistentie

Phytophthora in het loof	7
Phytophthora in de knol	6
Schurft	6,9
Poederschurft	7
Globodera Ro 1 (A)	9
Kringerigheid (TRV)	9
Aardappel Y virus	8

## Teeltadvies (pootgoed)

### Hoeveelheid en plantafstand - Bemesting

Maat	kg/ha	75 cm rug
28/35 mm	2.400	11-13
35/55 mm	5.700	15-17
55/60 mm	9.100	19-21

Tel altijd het aantal knollen! Zwaardere gronden vereisen een nauwere plantafstand.

Meststof	% t.o.v. standaard	Toepassen		
		1 <sup>ste</sup>	2 <sup>de</sup>	3 <sup>de</sup>
N	80	4/4		
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	100	4/4		
K <sub>2</sub> O	100	4/4		



- Bewaring met Ethyleen heeft positief effect op knolaantal.
- Start tijdig met beregenen. Heeft niet veel stikstof nodig.
- Niet planten op zwaardere gronden.
- Planten op normale pootdiepte.
- Kent een goede bladontwikkeling en geeft voldoende loof. Tweede toediening van meststoffen is onder normale omstandigheden niet nodig.
- Start met spuiten tegen Phytophthora bij 80% opkomst.
- Houd een strak spuitschema aan met luizenbestrijding.
- Start tijdig met selectie en keer frequent terug voor controle.
- Wees voorzichtig met moederknollen en voorkom roibeschatiging.
- Wacht met oogsten totdat de schil is afgerijpt.
- Zorg na het oogsten voor een goede ventilatie tijdens de bewaring tot de aardappels droog zijn. Tijdens langdurige bewaring regelmatig ventileren en geleidelijk afkoelen voor transport.

