

MIRANDA



Fritesaardappel

- ✓ Vroeg geelvezig ras
- ✓ Langovale knollen
- ✓ Uitstekend voor vroege verwerking friet
- ✓ AM-resistentie (Ro1)
- ✓ Wratziekte resistentie (f1)



Eigenschappen

Fysiologie

Schilkleur	Geel
Vleeskleur	Geel
Vorm	Ovaal tot langovaal
Regelmaat vorm	7
Aantal knollen per plant	13
Oogdiepte	8
Rijptijd	7,5
Kiemrust	7
Bewaarbaarheid	5
Stootblauw (0-50)	8
Rooibeschatiging	7
Holle harten	9

Opbrengst - kwaliteit

Relatieve opbrengst	90
Drogestofgehalte (OWG)	21,2% (390)
Kooktype	BC
Verkleuring na koken	8
Bakkleur na het oogsten	7
Bakkleur na bewaring	7

Resistentie

Phytophthora in het loof	2,1
Phytophthora in de knol	9
Schurft	5,6
Poederschurft	4
Globodera Ro 1 (A)	9
Wratziekte f1 (D1)	10
Kringerigheid (TRV)	6,3
Aardappel Y virus	7



Deze informatie is naar beste weten en overtuiging opgesteld en dient ter oriëntatie en besluitvorming. Ran gezien de aardappel een natuurlijk product is, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen. Neem voor vragen of advies contact op met je teelthegeleider of mail info@denhartigh-potato.nl.

VERSIE OKTOBER 2022

Teeltadvies (pootgoed)

Hoeveelheid en plantafstand - Bemesting

Maat	kg/ha	75 cm rug
28/35 mm	2.500	12-14
35/55 mm	6.800	14-16
55/60 mm	10.700	18-20

Tel altijd het aantal knollen! Zwaardere gronden vereisen een nauwere plantafstand.

Meststof	% t.o.v. standaard	Toepassen		
		1 ^{ste}	2 ^{de}	3 ^{de}
N	100	4/4		
P ₂ O ₅	100	4/4		
K ₂ O	100	4/4		



- Vermijd grond met vrijlevende aaltjes. Gebruik bij twijfel granulaat voor bestrijding van nematoden.
- Planten in het witte puntjes stadium geeft het beste resultaat.
- Plant iets onder het maaiveld.
- Onkruidbestrijding voor opkomst wordt aanbevolen.
- Start met spuiten tegen Phytophthora bij 80% opkomst
- Toepassing van magnesium en mangaan vroeg in het seizoen heeft een positief effect.
- Houd een strak spuitschema aan met luizenbestrijding.
- Start tijdig met selectie en keer frequent terug voor controle.
- Begin tijdig met preventieve behandeling tegen Alternaria.
- Start tijdig met spuiten tegen knolphytophthora.
- Miranda geeft geen problemen rond loofdoding.
- Wacht met oogsten tot de schil is afgehard.
- Wees voorzichtig met moederknollen en voorkom rooibeschatiging.
- Zorg na het oogsten voor goede ventilatie tijdens de bewaring tot de aardappels droog zijn.
- Tijdens langdurige opslag regelmatig ventileren en geleidelijk afkoelen. Voor transport langzaam opwarmen.