

PRADA



Tafelaardappel

- ✓ Zeer vroeg, geelvezig ras
- ✓ Uiterst gladde en helder gele schil
- ✓ Geschikt voor productie van thuisfriet
- ✓ Sterk op Y-virus
- ✓ AM-resistentie (Ro1)
- ✓ Wratziekte resistentie (f1)



Eigenschappen

Fysiologie

Schilkleur	Lichtgeel
Vleeskleur	Geel
Vorm	Ovaal tot langovaal
Regelmaat vorm	7
Aantal knollen per plant	9
Oogdiepte	8
Rijptijd	8,4
Kiemrust	8
Bewaarbaarheid	6
Stootblauw (0-50)	3
Rooibeschatiging	7
Holle harten	9

Opbrengst - kwaliteit

Relatieve opbrengst	89
Drogestofgehalte (OWG)	18,1% (328)
Kooktype	AB
Verkleuring na koken	7
Bakkleur na het oogsten	6
Bakkleur na bewaring	3

Resistentie

Phytophthora in het loof	3,1
Phytophthora in de knol	6
Schurft	6,5
Poederschurft	6
Globodera Ro 1 (A)	8
Wratziekte f1 (D1)	10
Kringerigheid (TRV)	4,1
Aardappel Y virus	9



Deze informatie is naar beste weten en overtuiging opgesteld en dient ter oriëntatie en besluitvorming. Rangezien de aardappel een natuurlijk product is, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen. Neem voor vragen of advies contact op met je teelthegeleider of mail info@denhartigh-potato.nl.

VERSIE OKTOBER 2022

Teeltadvies (pootgoed)

Hoeveelheid en plantafstand - Bemesting

Maat	kg/ha	75 cm rug
28/35 mm	2.500	12-14
35/55 mm	7.700	14-16
55/60 mm	10.800	18-20

Tel altijd het aantal knollen! Zwaardere gronden vereisen een nauwere plantafstand.

Meststof	% t.o.v. standaard	Toepassen		
		1 ^{ste}	2 ^{de}	3 ^{de}
N	100	3/4	1/4	
P ₂ O ₅	100	4/4		
K ₂ O	100	4/4		



- Vermijd gronden met vrijlevende aaltjes. Gebruik bij twijfel granulaat voor bestrijding van nematoden.
- Bewaring met Ethyleen heeft een positief effect.
- Knolbehandeling tegen zilverschurft is gewenst.
- Planten in het witte puntjes stadium geeft het beste resultaat.
- Is gevoelig voor Metribuzin. Gebruik alleen direct na opbouw van ruggen, niet kort voor opkomst.
- Toepassing van magnesium en mangaan vroeg in het seizoen heeft een positief effect.
- Start met spuiten tegen Phytophthora bij 80% opkomst.
- Houd een strak spuitschema aan met luizenbestrijding.
- Start tijdig met selectie en keer frequent terug voor controle.
- Begin tijdig met preventieve behandeling tegen Alternaria.
- Start tijdig met spuiten tegen knolphytophthora.
- Geeft geen problemen rond loofdoding.
- Wacht met oogsten tot de schil is afgehard.
- Wees voorzichtig met moederknollen en voorkom rooibeschatiging.
- Vatbaar voor Fusarium en zilverschurft.
- Zorg na het oogsten voor goede ventilatie tijdens de bewaring tot de aardappels droog zijn.