

LANORMA



Tafelaardappel

- ✓ Middenvroeg ras
- ✓ Uitstekend voor de baker markt
- ✓ Goede schilkwaliteit, ook na langdurige opslag
- ✓ AM-resistentie (Ro1)
- ✓ Wratziekte resistentie (f1)



Eigenschappen

Fysiologie

Schilkleur	Lichtgeel
Vleeskleur	Lichtgeel
Vorm	Rondovaal tot ovaal
Regelmaat vorm	7
% 35/65	66%
Aantal knollen per plant	11
Oogdiepte	7
Rijptijd	6
Kiemrust	7
Bewaarbaarheid	7
Stootblauw (0-50)	11
Rooibeschatiging	7

Opbrengst - kwaliteit

Relatieve opbrengst	113
Drogestofgehalte (OWG)	17,1% (307)
Kooktype	AB
Verkleuring na koken	7
Bakkleur na het oogsten	4
Bakkleur na bewaring	3

Resistentie

Phytophthora in het loof	3,7
Phytophthora in de knol	7,7
Schurft	6,7
Poederschurft	7
Globodera Ro 1 (A)	9
Globodera Pa 2 (D)	6
Wratziekte f1 (D1)	10
Kringerigheid (TRV)	6,1
Aardappel Y-virus	6.5



Deze informatie is naar beste weten en overtuiging opgesteld en dient ter oriëntatie en besluitvorming. Rangezien de aardappel een natuurlijk product is, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen. Neem voor vragen of advies contact op met je teelthegeleider of mail info@denhartigh-potato.nl.

VERSIE OKTOBER 2022

Teeltadvies (consumptie)

Hoeveelheid en plantafstand - Bemesting

Maat	kg/ha	75 cm rug
28/35 mm	1.000	24-26
35/45 mm	2.000	28-30
45/50 mm	3.000	31-33
35/50 mm	2.400	29-31
50/60 mm gesneden	2.400	29-31

Tel altijd het aantal knollen! Zwaardere gronden vereisen een nauwere plantafstand.

Meststof	% t.o.v. standaard	Toepassen		
		1 ^{ste}	2 ^{de}	3 ^{de}
N	100	3/4	1/4	
P ₂ O ₅	100	4/4		
K ₂ O	100	4/4		



- Geschikt voor elke grondsoort.
- Een goede bodemstructuur is nodig voor een regelmatig knolvorm.
- Knolbehandeling tegen zilverschurft is gewenst.
- Planten in het witte puntjes stadium geeft het beste resultaat.
- Lichtgevoelig voor Metribuzin (Sencor).

- Start met spuiten tegen Phytophthora bij 80% opkomst.
- Tweede stikstofgift als de plant begint met knolzetting.

- Start tijdig met spuiten tegen knolphytophthora.

- Wacht met oogsten tot de schil is afgehard.
- Wees voorzichtig met moederknollen en voorkom rooibeschatiging.
- Zorg na het oogsten voor goede ventilatie tijdens opslag tot de aardappels droog zijn. Tijdens langdurige opslag regelmatig ventileren en geleidelijk afkoelen tot 4-5C.