

EDISON



Frites- en tafelaardappel

- ✓ Middenvroeg
- ✓ Hoge opbrengst, goed bewaarbaar
- ✓ Goed onder drogere omstandigheden
- ✓ Sterk tegen Y-virus
- ✓ AM-resistentie (Ro1)
- ✓ Wratziekte resistentie (f1)



Eigenschappen

Fysiologie

Schilkleur	Geel
Vleeskleur	Lichtgeel
Vorm	Langovaal
Regelmaat vorm	7
Aantal knollen per plant	13
Oogdiepte	7
Rijptijd	6,1
Kiemrust	9
Bewaarbaarheid	6
Stootblauw (0-50)	8
Rooibeschatiging	6
Holle harten	9

Opbrengst - kwaliteit

Relatieve opbrengst	117
Drogestofgehalte (OWG)	21,4% (395)
Kooktype	B
Verkleuring na koken	6
Bakkleur na het oogsten	9
Bakkleur na bewaring	8

Resistentie

Phytophthora in het loof	4,7
Phytophthora in de knol	6
Schurft	7
Poederschurft	9
Globodera Ro 1 (A)	9
Wratziekte f1 (D1)	10
Kringerigheid (TRV)	7
Aardappel Y virus	7,5



Deze informatie is naar beste weten en overtuiging opgesteld en dient ter oriëntatie en besluitvorming. Rangezien de aardappel een natuurlijk product is, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen. Neem voor vragen of advies contact op met je teeltbegeleider of mail info@denhartigh-potato.nl.

VERSIE OKTOBER 2022

Teeltadvies (pootgoed)

Hoeveelheid en plantafstand - Bemesting

Maat	kg/ha	75 cm rug
28/35 mm	2.700	10-12
35/55 mm	7.600	14-16
55/60 mm	10.900	18-20

Tel altijd het aantal knollen! Zwaardere gronden vereisen een nauwere plantafstand.

Meststof	% t.o.v. standaard	Toepassen		
		1 ^{ste}	2 ^{de}	3 ^{de}
N	100	3/4	1/4	
P ₂ O ₅	100	4/4		
K ₂ O	100	4/4		



- Talent bewaring heeft vaak positief effect op knolaantal.
- Gebruik fysiologisch jong uitgangsmateriaal.
- Kent lange kiemrust. Pootgoed niet kouder dan 5°C bewaren.
- Geschikt voor alle grondsoorten.
- Planten in het witte puntjes stadium geeft het beste resultaat.
- Altijd preventieve knol-/bodembehandeling tegen Rhizoctonia.
- Lichtgevoelig voor Metribuzin.
- Start met spuiten tegen Phytophthora bij 80% opkomst.
- Bij lage ziektedruk (Phytophthora), handhaaf voorgeschreven spuitschema met lagere dosering.
- Start tijdig met selectie en keer frequent terug voor controle.
- Tweede N-gift toedienen indien gewenst.
- Vanaf juli Phytophthora-middelen met knolbescherming toepassen.
- Controleer tijdig de maatsortering.
- Start loofdoding wanneer het gewas voldoende is afgerijpt.
- Wacht met oogsten tot de schil is afgehard en niet rooien met hoge bodemtemperaturen
- Wees voorzichtig met moederknollen en voorkom rooibeschatiging.
- Behandel tegen bewaarziekten tijdens inschuren.
- Zorg na het oogsten voor een goede ventilatie tijdens de bewaring tot de aardappels droog zijn.
- Tijdens langdurige bewaring regelmatig ventileren en geleidelijk afkoelen. Voor transport langzaam opwarmen.