

# LAPERLA



## Tafelaardappel

- ✓ Zeer vroeg ras
- ✓ Aantrekkelijke lichtgele gladde schil
- ✓ Hoge opbrengst in vroege afzetgebieden
- ✓ AM-resistentie (Ro1)
- ✓ Wratziekte resistentie (f1)

## Eigenschappen

### Fysiologie

Schilkleur	Lichtgeel
Vleeskleur	Lichtgeel
Vorm	Rondovaal
Regelmaat vorm	7
% 35/65	51%
Aantal knollen per plant	9
Oogdiepte	7
Rijptijd	7,6
Kiemrust	6
Bewaarbaarheid	6
Stootblauw (0-50)	3
Rooibeschatiging	6
Holle harten	9

### Opbrengst - kwaliteit

Relatieve opbrengst	120
Drogestofgehalte (OWG)	15,3% (271)
Kooktype	A
Verkleuring na koken	7
Bakkleur na het oogsten	2
Bakkleur na bewaring	2

### Resistentie

Phytophthora in het loof	4,3
Phytophthora in de knol	9
Schurft	4,7
Poederschurft	6
Globodera Ro 1 (A)	9
Wratziekte f1 (D1)	10
Kringerigheid (TRV)	7
Aardappel Y virus	4,5



Deze informatie is naar beste weten en overtuiging opgesteld en dient ter oriëntatie en besluitvorming. Rangetzien de aardappel een natuurlijk product is, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen. Neem voor vragen of advies contact op met je teelthegeleider of mail [info@denhartigh-potato.nl](mailto:info@denhartigh-potato.nl).

VERSIE OKTOBER 2022

## Teeltadvies (consumptie)

### Hoeveelheid en plantafstand - Bemesting

Maat	kg/ha	75 cm rug
28/35 mm	1.100	23-25
35/45 mm	1.900	28-30
45/50 mm	2.800	31-33
35/50 mm	2.300	29-31
50/60 mm gesneden	2.300	29-31

Tel altijd het aantal knollen! Zwaardere gronden vereisen een nauwere plantafstand.

Meststof	% t.o.v. standaard	Toepassen		
		1 <sup>ste</sup>	2 <sup>de</sup>	3 <sup>de</sup>
N	100	4/4		
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	110	4/4		
K <sub>2</sub> O	110	4/4		



- Vermijd gronden die schurftgevoelig zijn.
- Planten in het witte puntjes stadium geeft het beste resultaat.
- Gebruik fysiologisch jong pootgoed.
- Knolbehandeling tegen Rhizoctonia verbetert de regelmaat van de knolgrootte.
- Gevoelig voor Metribuzin.
- Laperla heeft een langzame loofontwikkeling, maar de knolvorming begint vroeg.
- Start met spuiten tegen Phytophthora bij 80% opkomst.
  
- Start tijdig met preventieve behandeling tegen Alternaria.
  
- Heeft een vroege afrijping. Loofdoding levert geen problemen op.
  
- Traag huidvast!
  
- Wacht met oogsten tot de schil is afgehard.
- Wees voorzichtig met moederknollen en voorkom rooibeschatiging.
- Het drogen van knollen is belangrijk voor een goede schilkwiteit.
- Verlaag de opslagtemperatuur geleidelijk.